

Oxiconazole - Allaitement

- Au vu des données disponibles sur sur les antifongiques locaux (cf. Etat des connaissances), l'utilisation du tioconazole est possible en cours d'allaitement.

Date de mise à jour : 13.05.22

FONX®

L'oxiconazole est un antifongique de la famille des imidazolés.

Il est utilisé par voie cutanée.

Le passage systémique de l'oxiconazole est faible par cette voie d'administration.

ETAT DES CONNAISSANCES

- Il n'y a pas de donnée publiée sur les antifongiques locaux en cours d'allaitement.
- Cependant leur usage est probablement fréquent et aucun évènement particulier n'est signalé à ce jour chez des enfants allaités.
- Par ailleurs le passage systémique des antifongiques par voie locale est généralement très faible lors d'une utilisation.

EN PRATIQUE

- Au vu des données disponibles sur sur les antifongiques locaux (cf. Etat des connaissances), l'utilisation de l'oxiconazole est possible en cours d'allaitement.
 - En cas d'application sur le mamelon, nettoyer le sein avant la tétée.
-

Consulter aussi sur notre site

[Oxiconazole – Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
